

PAUTAS después de una endodoncia

INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES DESPUÉS DE UNA ENDODONCIA

POR FAVOR, LEA ATÉNTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

LE AYUDARÁN A MEJORAR MÁS RÁPIDAMENTE Y LE EVITARÁN COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

1. COMIDAS

Terminada la cita es posible que el efecto del anestésico no haya cesado, por lo tanto evite comer hasta que pase el efecto, previniendo posibles lesiones en los tejidos blandos así como el desalojo del cemento temporal utilizado para sellar el diente. En caso de que esto suceda debe asistir lo más pronto posible a nuestras instalaciones.

2. MEDICACIÓN:

Los tejidos adyacentes al diente pueden quedar inflamados y es posible que experimente un dolor de leve a moderado durante varios días después de realizado el tratamiento de endodoncia. Este se incrementa con la masticación y se controla con la medicación sugerida en nuestra consulta, existen casos en los que pueden persistir molestias durante un período de 3 meses.

Hay situaciones en que se presentan síntomas de dolor intenso, inflamación y supuración. A pesar de todo ello, el pronóstico del tratamiento de endodoncia es bueno. Siga al pie de la letra el protocolo de medicación postoperatoria propuesto por nuestros profesionales y si no le fue dado, comuníquese inmediatamente con nuestros teléfonos para atenderlo lo más pronto posible. En el caso en que se receten antibióticos, continúe tomándolos como se le indica, incluso si han desaparecido todos los signos y síntomas de la infección.

3. RESTAURACIÓN DEL DIENTE:

Evite, en lo posible, masticar con el diente tratado endodónticamente hasta que se haya realizado la restauración definitiva. Esta debe ser realizada en el plazo que le aconsejó su doctor una vez terminada la endodoncia. Cumpla con las citas programadas con este fin para evitar el fracaso del tratamiento endodóntico por contaminación, o la fractura del diente, de no ser así la clínica no se hace responsable del pronóstico del tratamiento.

4. REVISIONES

Es de suma importancia que asista a sus citas de control para evitar una complicación o mayor avance de la patología. En algunos casos es posible que se requieran procedimientos adicionales como una cirugía apical para resolver la patología de origen. En algunos casos no es posible terminar el tratamiento endodóntico en una sola cita, si es así, es importante que asista para terminar su tratamiento, así usted no sienta dolor.

5. HIGIENE ORAL:

Continúe con su protocolo de higiene oral habitual usando el cepillo y la seda dental.

6. MEDICACIÓN:

Por favor, siga estrictamente las pautas de medicación que se le indican a continuación:

- Antibiótico:
- Antiinflamatorio:
- Analgésico:

JOSE LUIS RULL RIVERA